

## Protokół nadzoru dla schwannomatozy

	Badanie	Częstość	Wiek rozpoczęcia	Siła zaleceń*
Schwannomatoza	Badanie kliniczne z oceną bólu i badanie neurologiczne	Corocznie	12-14 rok życia	Umiarkowane
Schwannoma	MRI mózgu i kręgosłupa	Zgodnie z konkretnymi zaleceniami dotyczącymi genu / wieku	Diagnoza lub 12-14 rok życia	Silne
	Rezonans magnetyczny całego ciała	Wyjściowo lub wkrótce po. Do rozważenia naprzemiennie z MRI rdzenia kręgowego	Diagnoza lub 12-14 rok życia	Umiarkowane
	USG	Do rozważenia, gdy dotyczy kończyn lub międzyżebry	W stosownych przypadkach	Umiarkowane

\* Ta ocena jest oparta na opublikowanych artykułach i konsensusie ekspertów: silne – konsensus ekspertów ORAZ spójne dowody, umiarkowane – konsensus ekspertów Z niespójnymi dowodami I/LUB nowe dowody, które mogą poprzeć zalecenie, słabe – decyzja większości ekspertów BEZ spójnych dowodów

# Protokół nadzoru dla schwannomatozy

Niniejsze wytyczne zostały opracowane na podstawie najlepszych dostępnych dowodów oraz konsensusu ekspertów w tej dziedzinie i są regularnie aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian w pojawiających się doniesieniach.

Oczekuje się, że klinicyści będą postępować zgodnie z tymi wytycznymi, chyba że istnieje przekonujący powód kliniczny specyficzny dla danego pacjenta, aby tego nie robić.



**European  
Reference  
Network**

for rare or low prevalence  
complex diseases



**Network**  
Genetic Tumour Risk  
Syndromes (ERN GENTURIS)



[www.genturis.eu](http://www.genturis.eu)